

TADALAFIL MAXON

10 mg, tabletki powlekane (tadalafil)

ANKIETA (narzędzie diagnostyczne)

UWAGA!

Ten lek, TADALAFIL MAXON, zawierający tadalafil, przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzdrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek może być dla Ciebie, jeśli jesteś dorosłym (> 18 r.ż.) mężczyzną, a problemy ze wzdrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, przejdź do pytań poniżej.

ZAZNACZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA PONIŻEJ - SPRAWDŹ CZY MOŻESZ BEZPIECZNIE PRZYJĄĆ LEK

	TAK lub NIE WIEM	NIE
<p>a Czy stosujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej)? Jeżeli stosujesz poniższe leki, przyjęcie leku TADALAFIL MAXON może zagrażać Twojemu życiu!</p> <p>1 nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit) 2 izosorbid (np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Mono Mack Depot, Mononit, Monosan, Olicard) 3 pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum) 4 molsidominę (np. Molsidomina WZF)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>b Czy występują u Ciebie następujące objawy związane z chorobami serca/krażenia?</p> <p>1 w ciągu ostatnich 2 miesięcy pojawiał się ból za mostkiem w klatce piersiowej 2 w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia 3 zwykła, codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie 4 często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca (arytmie), które NIE jest leczone 5 często miewasz zawroty głowy, wrażenie omdlewania 6 masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg) 7 masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg), które NIE jest leczone 8 w ostatnich 6 miesiącach przeżyłeś zawał serca lub udar mózgu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>c Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?</p> <p>1 masz skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub rozpoznaną chorobę Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia) 2 stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji 3 leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV 4 stosujesz leki z powodu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach), takie jak riociguat (np. Adempas) 5 utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra (tzw. "porażenie oka") 6 rozpoznano u Ciebie ciężkie choroby wątroby</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>d Czy występują u Ciebie:</p> <p>1 dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa) 2 białaczka (choroba nowotworowa krwi) 3 szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>e Czy stosujesz leki używane w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego (prostaty, stercza) i/lub w nadciśnieniu tętniczym?</p> <p>1 doksazosynę (np. Apo-Doxan, Cardura, Doxagen, Doxalong, Doxanorm, Doxar, Doxazosin, Doxonex, Doxorion, Dozox, Kamiren, Zoxon) 2 terazosynę (np. Hytrin, Kornam, Setegis) 3 alfuzosynę (np. Alfabax, AlfulEK, Alfurion, Afluzostad, Alugen, Dalfaz) 4 silodosynę (np. Silodyx, Urorec) 5 tamsulosynę (np. Adatam, Apo-Tamis, Bazetham, Duodart, Fokusin, Miktosan, OMI-TAM, Omnic, Omsal, Prostanic, Ranlosin, Suprostitv, Symlosin, Tamiron, TamisPRAS, Tamsudil, Tamsugen, Tamsulosin, Tanyz, Uprox, Urostat, Vesomni) 6 dutasteryd (np. Adadut, Avodart, Davoster, Dustar, Dutasteride, Dutasteryd, Dutrys, Findarts) 7 finasteryd (np. Adaster, Androster, Antiprost, Apo-Fina, FinaGen, Finahit, Finamef, Finaran, Finaride, Finaster, Finasterid Stada, Finasteride, Finasteridum Bluefish, Finiprost, Finpros, Finxta, Hyplafin, Penester, Proscar, Symasteride, Uronezyr, Zasterid)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>f Czy jesteś obecnie w trakcie leczenia lekami przeciwbakteryjnymi (antybiotykami)?</p> <p>1 erytromycyną (np. Davercin, Erythromycinum TZF) 2 klarytromycyną (np. Apiclar, Fromilid, Klabax, Klabion, Klabiotic, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>g Czy stosujesz poniższe leki przeciwgrzybicze?</p> <p>1 itraconazol (np. Ipozumax, Itraconazole, ItraGen, Itrax, Itrokast, Itromyx, Orungal, Trioxal) 2 flukonazol (np. Candifluc, Diflucan, Flucofast, Fluconazin, Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, Fluconazole, Flucorta, Flukonazol roztwór do infuzji 2 mg/ml, Flumycon, Fluxazol, Locaring, Mycomax, Mycosyst) 3 ketokonazol (np. Ketokonazol, Ketoconazole Hasco, Ketoconazole HRA) - obecnie stosowany w leczeniu zespołu Cushinga (nadmiernego wytwarzania kortyzolu w organizmie)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ODCZYTAJ WYNIK I ZAZNACZ DECYZJĘ PONIŻEJ W KRATCE:

NIE MOGĘ ZASTOSOWAĆ LEKU TADALAFIL MAXON BEZ KONSULTACJI Z LEKARZEM

Przynajmniej
1xTAK
lub NIE WIEM

LUB

MOGĘ ZASTOSOWAĆ LEK TADALAFIL MAXON

Wszystkie NIE

Przed zastosowaniem leku przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania. Lek NIE jest przeznaczony do stałego, codziennego przyjmowania. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz zastosować lek TADALAFIL MAXON, przed użyciem leku skonsultuj się z farmaceutą. **PAMIĘTAJ!** Problemy ze wzdrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzdrodu. Występowanie zaburzeń wzdrodu jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym serca. Dlatego też w trakcie okresowych wizyt, zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzdrodem i o tym, że przyjmujesz TADALAFIL MAXON.