

- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi czas,
- krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z pochwy o większym nasileniu niż normalnie,
- krew w moczu która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,
- odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

**Jak przyjmować lek RIXACAM**

- W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek RIXACAM
  - 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
  - 15 mg trzeba przyjmować z jedzeniem
  - 20 mg trzeba przyjmować z jedzeniem.

**W nagłym przypadku należy powiadomić:**

Imię i nazwisko lekarza:

---

Telefon lekarza:

---

Pieczętka lekarza:

---

**Należy również powiadomić:**

Imię i nazwisko:

---

Pokrewieństwo:

---

Telefon:

---

**Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem RIXACAM (rywaroksaban)**

Imię i nazwisko:

---

Inne leki/choroby:

---

Adres:

---

Data urodzenia:

---

Masa ciała:

---

**Informacja dla lekarza**

- Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku RIXACAM i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia.


### Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak RIXACAM, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie należy rozpoczynać przyjmowania leku RIXACAM bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort, ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,

-2-



## KARTA PACJENTA

- RIXACAM 10 mg    ■ RIXACAM 20 mg
- RIXACAM 15 mg



- **Kartę należy zawsze przechowywać przy sobie**
- **Kartę należy pokazać przed leczeniem każdemu lekarzowi lub dentyście**

-1-

### Co należy wiedzieć o leku RIXACAM

- Lek RIXACAM rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek RIXACAM należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, nigdy **nie należy pomijać dawki.**
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku RIXACAM bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku RIXACAM należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek RIXACAM przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.